




# Entropy




Sasitha Madushan BS.c(Hons)

0712470326

ප්‍රතික්‍රියාවක ස්වයංසිද්ධතාවය

බාහිර බලපෑමක් නොමැතිව ඉඩේ සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

පහත උදාහරණ සලකන්න.



ඉහත උදාහරණ අනුව ප්‍රතික්‍රියාවක් අපට විලැඹිය හැකි නිගමනයන් වන්නේ,

- $\Delta H < 0$  වුවද ප්‍රතික්‍රියා ස්වයංසිද්ධ නොවන අවස්ථා ඇත.
- $\Delta H > 0$  වුවද ප්‍රතික්‍රියා ස්වයංසිද්ධ වන අවස්ථා ඇත.

මේ අනුව ප්‍රතික්‍රියාවක ස්වයංසිද්ධතාවය එන්තැල්පි වෙනස ( $\Delta H$ ) මගින් පමණක් තීරණය කල නොහැක. ප්‍රතික්‍රියාවක ස්වයංසිද්ධතාවය සඳහා තවත් අමතර සාධකයක් බලපායි.

ඉහත ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියා සැලකූ විට සියලුම ප්‍රතික්‍රියා වලදී නිශ්චිත රථාවකට ඇසුරුණු පද්ධතිය නිශ්චිත රථාවක් නොමැති ඇසිරීමකට වෙනස් වේ. එනම් පද්ධතියේ අහඹුතාවය ඉහල යයි. මේ අනුව පද්ධතියේ අහඹුතාවය වෙනස් වීම යන සාධකය මතද ප්‍රතික්‍රියාවක ස්වයංසිද්ධතාවය රඳා පවතී.

එන්ට්‍රොපිය (Entropy)/(S)

එන්ට්‍රොපිය පද්ධතියක අහඹුතාවය පිළිබඳ මිනුමකි.

- පද්ධතියක අහඹුතාවය ඉහළ යන විට එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ.
- පද්ධතියක අහඹුතාවය පහළ යන විට එන්ට්‍රොපිය අඩු වේ.

උදා : ඝන ස්පට්ටියක එන්ට්‍රොපිය කුඩා අගයකි. නමුත් වායුවක එන්ට්‍රොපිය සාපේක්ෂව ඉහළ වේ.


*Standard entropies, S<sup>ϕ</sup>, of various substances at 298 K*

Substance	State	S <sup>ϕ</sup> / JK <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup>
C <sub>(Diamond)</sub>	s	2.4
Ar	g	154.7
CO <sub>2</sub>	g	213.6
Al	s	28.3
Fe	s	27.2
H <sub>2</sub> O <sub>(s)</sub>	s	48.0
H <sub>2</sub> O <sub>(l)</sub>	l	70.0
H <sub>2</sub> O <sub>(g)</sub>	g	188.7
NaCl	s	72.4
SiO <sub>2</sub>	s	41.8

ඒකලිත පද්ධතියක සිදුවන විපර්යාස සිදුවන්නේ එන්ට්‍රොපිය හිසාය.

එන්ට්‍රොපිය කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම

ඝන දැලිඝන  $0\text{ K}$  (*absolute zero*) දී එන්ට්‍රොපිය ශුන්‍ය වේ.  
 උෂ්ණත්වය වැඩිවත්ම පද්ධතියේ එන්ට්‍රොපිය ද ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ.  
 අවස්ථා විපර්යාස වලදී එන්ට්‍රොපියේ විශාල වැඩිවීම් දක්නට ලැබේ.




එන්ට්‍රොපිය අවස්ථා ශ්‍රිතයකි. එම නිසා එන්ට්‍රොපිය රඳා පවතින්නේ පද්ධතියේ ආරම්භක හා අවසාන අවස්ථා මත පමණි. විපර්යාසය සිදුවන මාර්ගය මත රඳා නොපවතී.

විපර්යාසයක එන්ට්‍රොපි වෙනස,

$$\Delta S = S_{(අවසාන)} - S_{(ආරම්භක)}$$

$$\Delta S^\phi = S^\phi_{(අවසාන)} - S^\phi_{(ආරම්භක)}$$



අහඹුතාවය අඩු ප්‍රතික්‍රියක අහඹුතාවය වැඩි වීමට බවට පත්වන විට  $\Delta S > 0$



අහඹුතාවය වැඩි ප්‍රතික්‍රියක අහඹුතාවය අඩු වීමට බවට පත්වන විට  $\Delta S < 0$



පහත ප්‍රතික්‍රියා සලකන්න.



ඉහත ප්‍රතික්‍රියා අනුව  $\Delta S > 0$  වුවද ප්‍රතික්‍රියා ස්වයංසිද්ධ නොවේ. මේ අනුව ප්‍රතික්‍රියාවක ස්වයංසිද්ධතාවයට  $\Delta S$  හෝ  $\Delta H$  හෝ තනිව බල නොපායි. ප්‍රතික්‍රියාවක ස්වයංසිද්ධතාවය කෙරෙහි  $\Delta S$  හා  $\Delta H$  යන සාධක දෙකම බලපායි.

ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස ( $\Delta G$ )

විපර්යාසයක් කෙරෙහි  $\Delta S$  හා  $\Delta H$  සමස්ථ බලපෑම ගිබ්ස් ශක්ති වෙනසින් ලැබේ.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

හිසත උෂ්ණත්වයේ දී හා පීඩනයේ දී,  
 $\Delta G < 0$  ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වේ.

$\Delta G > 0$  ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ නොවේ.

$\Delta G = 0$  ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිත වේ.

මේ අනුව  $\Delta G$  මගින් ප්‍රතික්‍රියාව අදාල තත්ව වලදී සිදුවේද, සිදුනොවේ ද යන්න තීරණය කල හැක.

$\Delta H$	$\Delta S$	$\Delta G$	ප්‍රතිඵලය	උදාහරණ
0	+	-	ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වේ.	වායු මිශ්‍ර කිරීම.
0	-	+	ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ නොවේ.	වායු මිශ්‍රණයකින් නැවත වායු වෙන් කිරීම.
-	+	-	ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වේ.	වායු හිපදවෙන තාප දායක ප්‍රතික්‍රියා, උදා: බොහොමයක් ඉන්ධන දහනය.
-	-	+ හෝ -	අදාල තත්ව මත ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධතාවය රඳා පවතී. බොහෝ දුරට පහත් උෂ්ණත්ව වල දී ස්වයංසිද්ධ වේ.	වායු මවුල අඩුවන තාප දායක ප්‍රතික්‍රියා, උදා: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
+	+	+ හෝ -	අදාල තත්ව මත ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධතාවය රඳා පවතී. බොහෝ දුරට ඉහළ උෂ්ණත්ව වල දී ස්වයංසිද්ධ වේ.	වායු මවුල වැඩිවන තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා, උදා: ද්‍රව වාෂ්ප වීම
+	-	+	ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ නොවේ.	වායු මවුල අඩුවන තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා,

හිසත චන්ද්‍රෝපි පද්ධතියක  $\Delta S = 0$  ස්වයංසිද්ධතාව  $\Delta H$  මගින් තීරණය වන අතර හිසත චන්තලේපිය යටතේ  $\Delta H = 0$  සිදු වන විපර්යාසයක ස්වයංසිද්ධතාව  $\Delta S$  මගින් තීරණය වේ.

- පහත ආකාරයේ ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා උදාහරණ දෙන්න.
  - තාප අවශෝෂක
  - තාප දායක
  - චන්ද්‍රෝපිත වැඩිවෙමින් සිදුවන
  - චන්ද්‍රෝපිත අඩුවෙමින් සිදුවන
- පහත සඳහන් ක්‍රියාවල චන්ද්‍රෝපි විපර්යාස ( $\Delta S$ ) පිලිබඳව පුරෝකථනයක් දෙන්න.
  - චිතනෝල් සිසිල් කිරීම.
  - කාමර උෂ්ණත්වයේදී බ්‍රෝමීන් වාෂ්ප වීම.
  - ජලයේ ග්ලූකෝස් දිය කිරීම.
  - 80 °C සිට 20 °C දක්වා  $N_2$  වායුව සිසිල් කිරීම.

පහත දැක්වෙන සටහනෙහි  $O_2$ ,  $O_3$ ,  $NO$  සහ  $NO_2$  සඳහා වූ සම්මත උත්පාදන චන්තල්පි  $\Delta H_f^\theta$  යන සම්මත චන්ද්‍රෝපි අගයයන් ( $\Delta S^\theta$ ) දක්වා ඇත.

සම්මත උෂ්ණත්වය හා පිඩනයේදී



යන ප්‍රතික්‍රියාව සංසිද්ධව සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවක්ද? නැද්ද යන්න තීරණය කරන්න

	$O_2$	$O_3$	$NO$	$NO_2$
සම්මත චන්තල්පි $/kJmol^{-1}$	-	143	143	143
සම්මත චන්ද්‍රෝපි $/JK^{-1}mol^{-1}$	206	206	206	206

- පහත ප්‍රතික්‍රියාවල චන්ද්‍රෝපි වෙනස ලකුණ + හෝ - සඳහන් කරන්න.
  - $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$
  - $COCl_2(g) \rightarrow CO(g) + Cl_2(g)$
  - $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightarrow PCl_5(g)$
  - $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
  - $C_2H_{12}(g) + 9O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$
  - $C(s) + H_2O(g) \longrightarrow CO(g) + H_2(g)$


යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා  $\Delta H^\theta = +130 kJ$ ,  $\Delta S = +134 JK^{-1}$  වේ.  
ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයං සිද්ධව සිදුවන අවම උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න.

- $X$  හි විලයනය 400 K දී ප්‍රතිවර්ත වේ.  $X$  හි විලයනයේ චන්තල්පිය  $2.84 kJmol^{-1}$  නම් චන්ද්‍රෝපි වෙනස ගණනය කරන්න.
- ග්‍රැෆයිට් හා දියමන්ති කාබන් වල බහුරූපී ආකාර වේ. ඒවායේ සම්මත චන්ද්‍රෝපි අගයන් පහත දැක්වේ.

$$\Delta S_{graphite}^\phi = 5.7 JK^{-1}mol^{-1} \qquad \Delta S_{diamond}^\phi = 2.4 JK^{-1}mol^{-1}$$

- ග්‍රැෆයිට් හි සම්මත චන්ද්‍රෝපි අගය දියමන්ති හි සම්මත චන්ද්‍රෝපි අගයට වඩා වැඩි වීමට හේතුව පහදන්න.
- 25 °C දී  $C_{(graphite)} \longrightarrow C_{(diamond)}$  ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා චන්තල්පි විපර්යාසය  $2.4 kJ mol^{-1}$  නම් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස ගණනය කරන්න.
- 25 °C හා 1 atm දී ග්‍රැෆයිට් වලින් දියමන්ති සෑදෙන්නේ නැත්තේ ඇයිදැයි පහදන්න.

6. 10 °C දී ඇසිස් ජලය බවට පත්වේ.




- I. ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ව්‍යෝජන විපර්යාසය ධන වන්නේ ඇයි දැයි පහදන්න.
- II. 10 °C දී ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ශීඛිස් ශක්ති වෙනස ගණනය කර 10 °C දී ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වීම පැහැදිලි කරන්න.
- III. -10 °C දී ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ නොවන බව පෙන්වන්න.
- IV. ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිත වන උෂ්ණත්වය 273 K බව පෙන්වන්න.

7. පහත දත්ත සලකන්න

	$\Delta H_f^\phi / \text{kJ mol}^{-1}$	$S^\phi / \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$
$BaCO_{3(s)}$	-1216	+112.1
$BaO_{(s)}$	-553.5	70.4
$CO_{2(g)}$	-393.5	213.6

- I.  $BaCO_{3(s)}$  හි තාප විඝෝෂන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ව්‍යෝජන හා ව්‍යෝජන වෙනස සොයන්න.
- II. 25 °C ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වේ ද? ඔබේ පිළිතුර පහදන්න.



Compound	$\Delta H_f^\circ$ , kJ/mol	$\Delta G_f^\circ$ , kJ/mol	$S^\circ$ , J/(mol K)
Ba(s)	0	0	62.48
Ba <sup>2+</sup> (aq)	-537.64	-560.74	9.6
Ba(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> (s)	-768.2		
Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (s)	-992.07	-796.72	213.8
CH <sub>3</sub> OH(g)	-201.2	-161.9	238
CH <sub>3</sub> OH(l)	-238.6	-166.2	127
CO(g)	-110.5	-137.2	197.5
CO <sub>2</sub> (g)	-393.5	-394.4	213.7
H <sub>2</sub> (g)	0	0	130.6
H <sub>2</sub> O(l)	-285.8	-237.2	69.9
H <sub>2</sub> O(g)	-241.8	-228.6	188.7
H <sub>2</sub> S(g)	-20.6	-33.6	205.7
N(g)	472.7	455.6	153.2
N <sub>2</sub> (g)	0	0	191.5
NO(g)	90.2	86.6	210.7
NO <sub>2</sub> (g)	33.2	51.3	240.0
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (aq)	-207.4	-111.3	146.4
N <sub>2</sub> O(g)	82.05	104.2	219.7
N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (g)	11	118	346
O <sub>2</sub> (g)	0	0	205.0